

kion

FERTILIZANTE POTÁSICO DE ALTA GRADUACIÓN. TIOSULFATO POTÁSICO.

Exento de nitrógeno y cloro. Potasio libre de absorción rápida y eficaz (en mayor proporción que cualquiera de las moléculas de uso común en el olivar). Por su pH no se produce degradación en los fitosanitarios.

Riquezas garantizadas		
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	36,50% p/v	25,00% p/p
Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua	62,00% p/v	42,50% p/p
pH		8,3
Densidad		1,46 g/cc

Cuadro comparativo del potasio según el % de solubilidad

Producto	Riqueza	Solubilidad	% potasio en la solución
Kion	25 %	100 %	25%
Fertilizante NK	46 %	11,70 %	5,40 %
Fertilizante K	62 %	21,90 %	13,60 %
Fertilizante K	51 %	6,90 %	3,50 %

Kion aporta iones potasio cinco veces superior a la solución. Nueva molécula que combina el potasio iónico con azufre de rápida asimilación.

Formula preparada para su uso foliar y radicular.

Por su pH se minimiza la degradación alcalina rápida.

Dosis, cultivo y época de aplicación

Se recomienda su uso en primavera y otoño. Especialmente desde el endurecimiento del hueso hasta la recolección (oliva).

Después de grandes cosechas se aconseja su uso para recuperar las reservas del olivar.

APLICACIÓN FOLIAR:

EN GENERAL: Fases de engorde y maduración o formación de órganos de reserva: 2 cc/l

CÍTRICOS: Para el desarrollo de los frutos se realizarán de 1 a 3 aplicaciones. La primera cuando el fruto tenga un tamaño de 30-40 mm. aproximadamente, a partir de ese momento repetir cada 3 semanas. **IMPORTANTE: No aplicar nunca pasado el cambio de color.** Dosis máxima de 2 cc/l (No superar esta dosis).

OLIVAR: Aplicar desde la fase de endurecimiento del hueso hasta recolección y después de grandes cosechas para recuperar la planta. 5-15 cc/l. Media: 10 cc/l. Gasto: 6-10 l/aplicación.

VIÑA: Realizar un total de 2-3 aplicaciones a partir de que la uva tenga tamaño de guisante con un intervalo de 12-15 días entre cada aplicación. Dosis: 5 cc/l. Gasto: 5 l/ha aplicación.

APLICACIÓN RADICULAR:

PLYMAG no recomienda la aplicación de KION en riego localizado, no obstante siguen algunas indicaciones para uso vía suelo.

CÍTRICOS: Para potenciar el engorde o la maduración se pueden realizar varias aplicaciones según las necesidades: 15-20 l/ha.

OLIVAR: Aplicación en fertirrigación cada 4 semanas en el período de engorde: 60-100 cc/planta.

Advertencias e Incompatibilidades

No mezclar con productos muy ácidos. Evitar las mezclas con amoníaco anhidro y nitrato de calcio. Aunque KION suele ser compatible con los correctores de calcio (quelatos) se recomienda no aplicar si previamente no se hace una prueba previa.

